

# SPECIALITA' FATRO - TEMPI DI SOSPENSIONE E MODALITÀ DI PRESCRIZIONE



PRODOTTO	TEMPI DI SOSPENSIONE CARNI	TEMPI DI SOSPENSIONE LATTE	RICETTA
AAGENT®	63 gg	-	●●●
AAGENT® 10%	63 gg	-	●●●
ALIVIOS® (2)	7 gg bovini, equini - 18 gg suini	48 ore	●●●
CALCIO PH C.M.	0 gg	0 ore	●●
CEFAXIMIN®-L pomata antimastitica (6)	5 gg	144 ore (12 mungiture)	●●●
CEFAXIMIN®-L spray antimastitico (6)	5 gg	72 ore (6 mungiture)	●●●
CLOXALENE® MAX	8 gg	0 ore	●●●
CLOXALENE® PLUS pomata antimastitica	2 gg	48 ore	●●●
CLOXALENE® PLUS sospensione iniettabile (2)	4 gg bovini, 3 gg suini - 14 gg equini	48 ore	●●●
DALMARELIN®	0 gg	0 ore	●●
DALMAVITAL®	0 gg	0 ore	●●
DALMAZIN®	1 gg scrofe - 0 gg bovine	0 ore	●●
DETENASE®	0 gg	0 ore	●●
DODICILE	0 gg	0 ore	SP
DOLOVET® vet 160 mg/g	1 gg	0 gg	●●●
DOMIDINE®	2 gg cavalli, bovini (carni e visceri)	12 ore	●●●
ELMIPUR®	28 gg	9 gg	●●●
ENDOFER®	0 gg	-	●●
ENDOFER® 20	0 gg	-	●●
FATROCICLINA®	2 gg suini - 6 gg vitelli	-	●●●
FATROCORTIN (2)	16 gg bovini - 3 gg suini - 24 gg cavalli	72 ore (6 mungiture - 3 giorni)	●●●
FATROMECTIN® Pour-on (5)	31 gg	-	●●●
FATROMICINA 6.000.000 U.I. + 5 g	74 gg	168 ore	●●●
FATROXIMIN® ENDOMAMMARIO ASCIUTTA (6)	0 gg	0 ore	●●●
FATROXIMIN® ENDOUTERINO SCHIUMA (1-2)	0 gg	0 ore	●●●
FATROXIMIN® PESSARI EFFERVESCENTI (1)	0 gg	0 ore bovini - 72 ore bufalini	●●●
FATROXIMIN® SPRAY TOPICO	0 gg	0 ore	●●
FLUMEXIL® pasta orale 1,5 %	8 gg suinetti, agnelli, capretti - 6 gg conigli	-	●●●
FLUMEXIL® sospensione iniettabile 5% (2-3-4)	8 gg bovini, bufalini, equini, ovi-caprini, suini 6 gg polli, conigli	48 ore bovini, bufalini 144 ore caprini	●●●
GANABEN® SP	12 gg	-	●●●
GANADOL	0 gg	-	●●
HEPAGEN®	0 gg	0 ore	●●
IDRADE	0 gg	0 ore	●●
METABOLASE®	0 gg	0 ore	SP
METABOLASE® FORTE	0 gg	0 ore	●●
MICOSPECTONE® soluzione iniettabile	20 gg bovini, 18 gg suini	72 ore (6 mungiture)	●●●
MICOSPECTONE® polvere solubile (4)	14 gg vitelli, suinetti - 7 gg polli	-	●●●
NEATOX	0 gg	0 ore	●●
NEODIARISTIN	44 gg	-	●●●
NEOPRIDIMET (4)	5 gg	-	●●●
NEUROFISIN	0 gg	0 ore	●●
OXTRA® LONG ACTING (4)	39 gg bovini, bufalini, caprini - 16 gg suini 26 gg ovini - 20 gg polli da carne - 30 gg tacchini	14 gg (28 mungiture) bovini, bufalini 15 gg (30 mungiture) ovini, caprini	●●●
OXTRA® MV 10 (2)	15 gg bovini - 8 gg suini - 23 gg equini - 20 gg ovini	144 ore bovini - 216 ore ovini	●●●
PRACETAM® 200 mg/ml soluzione orale	0 gg	-	●●
PRACETAM® 200 mg/g polvere orale	0 gg	-	●●
PREQUILLAN® per equidi (1)	non pertinente	-	●●
PRIDIMET soluzione iniettabile	20 gg	84 ore (7 mungiture)	●●●
PRIDIMET soluzione orale (4)	12 gg suinetti	-	●●●
REPEN® (1-2)	11 gg polli, tacchini - 20 gg vitelli	-	●●●
REUFLOGIN® per equidi (1)	74 gg bovini, suini, ovini, caprini	108 ore bovini - 162 ore ovi-caprini	●●●
REUFLOGIN® per bovini e suini	non pertinente	-	●
SADIMET (2)	15 gg bovini - 12 gg suini	144 ore (12 mungiture)	●●●
SELEVIT®	Bovini: 6 gg e.v., 14 gg i.m./s.c., 35 gg o.s. - Equini 9 gg e.v., 14 gg i.m./s.c., 35 gg o.s. Ovini-Suini 10 gg e.v., 14 gg i.m./s.c., 35 gg o.s.	Bovini: 60 ore e.v., 264 ore i.m./s.c., 672 ore o.s. Ovini: 192 ore e.v., 264 ore i.m./s.c., 672 ore o.s.	●●●
SIMPANORM®	0 gg	-	●●
SUPRAMOX® S.P. (4)	1 gg	12 ore	●●●
SUPRATIL	20 gg vitelli - 2 gg suini - 1 gg polli, tacchini	-	●●●
SVERMINATOR®	28 gg bovini - 8 gg suini	72 ore (6 mungiture)	●●●
SVERMINATOR® 10	21 gg	72 ore (6 mungiture - 3 giorni)	●●●
TIRSAN® o.s. (4)	21 gg bovini, ovini	3 gg (6 mungiture) bovini, ovini	●●●
TOLOXAN	35 gg vitelli da latte - 5 gg suini - 6 gg broiler	-	●●●
TRULEVA® RTU	28 gg bovini - 42 gg ovini	-	●●●
URFAMYCIN® VET	8 gg bovini - 5 gg suini	0 ore	●●●
VALEMAS® 5 mg	10 gg bovini - 13 gg suini - 16 gg caprini	120 ore bovini, caprini (10 mungiture)	●●●
VALEMAS® 10 mg	Bovini: 7 gg e.v., 9 gg s.c. - Suini: 10 gg Ovini: 4 gg - Caprini: 14 gg - Conigli: 5 gg	Bovini: 84 ore e.v., 108 ore s.c. Ovini: 72 ore - Caprini: 192 ore	●●●
VETAMPLIUS® (2)	Bovini: 7 gg e.v., 9 gg s.c. - Suini: 10 gg Ovini: 4 gg - Caprini: 14 gg	Bovini: 84 ore e.v., 108 ore s.c. Ovini: 72 ore - Caprini: 192 ore	●●●
VETAMPLIUS® MUCOSOL (1-4-5)	3 gg bovini - 9 gg ovini, equini, suini	5 gg bovini, ovini (10 mungiture)	●●●
VETAMPLIUS® SUINI	3 gg bovini - 14 gg suini - 11 gg polli	-	●●●
VETAMPLIUS® 750 mg/g (per broiler e tacchini) (4)	3 gg	-	●●●
WONDERCEF®	1 gg polli da carne - 2 gg tacchini	-	●●●
ZOOCOLAGO C.M.	1 gg bovini - 2 gg suini	0 ore	●●●
	0 gg	0 ore	SP

## PREMISCELE PER ALIMENTI MEDICAMENTOSI

PRODOTTO	TEMPI DI SOSPENSIONE CARNI	TEMPI DI SOSPENSIONE LATTE	RICETTA
COMBOMIX® (4)	3 gg suini - 2 gg polli	-	●●●
GANABEN® PREMIX	12 gg suini	-	●●●
GANADOL PREMIX	0 gg suini	-	●●
NEOPRIDIMET ORALE	3 gg suini - 250 gradi/giorno salmonidi	-	●●●
PERLIUM AMOXIVAL®	5 gg suini	-	●●●
PRACETAM® 10%	1 gg suini	-	●●
SINTAGE®	10 gg suini	-	●●●
TIRSAN® POLVERE (4)	5 gg suini - 8 gg broiler	-	●●●

**VACCINI FATRO - BOVINI / SUINI / OVINI / CONIGLI / PESCI / AVIARI: tempi di sospensione: 0 giorni - 0 ore**

(1) Il prodotto non deve essere somministrato ad equidi destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

(2) Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.

(3) Non somministrare ad ovini il cui latte sia destinato al consumo umano.

(4) Non somministrare ad animali in ovodeposizione le cui uova siano destinate al consumo umano.

(5) Non somministrare ad animali in lattazione, il cui latte sia destinato al consumo umano.

(6) Non utilizzare a scopo alimentare le mammelle degli animali trattati.

- Ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile
- Ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile
- Ricetta medico-veterinaria ripetibile
- SP Senza prescrizione