

SPECIALITA' FATRO - TEMPI DI SOSPENSIONE E MODALITÀ DI PRESCRIZIONE



PRODOTTO	TEMPI DI SOSPENSIONE CARNI	TEMPI DI SOSPENSIONE LATTE	RICETTA
AAGENT®	63 gg	-	●●●
AAGENT® 10%	63 gg	-	●●●
ALIVIOS® (2)	7 gg bovini, equini - 18 gg suini	24 ore	●●●
CALCIO PH CM	0 gg	0 ore	●●
CEFAXIMIN®-L pomata antimastitica	5 gg	84 ore bovini - 156 ore bufale	●●●
CEFAXIMIN®-L spray antimastitico	5 gg	72 ore bovini - 144 ore bufale	●●●
CLOXALENE® MAX	8 gg	0 ore	●●●
CLOXALENE® PLUS pomata antimastitica	10 gg	48 ore	●●●
CLOXALENE® PLUS sospensione iniettabile (2)	4 gg bovini, 3 gg suini - 14 gg equini	48 ore	●●●
DALMARELIN®	0 gg	0 ore	●●
DALMAVITAL®	0 gg	0 ore	●●
DALMAZIN®	1 gg scrofe - 0 gg bovine	0 ore	●●
DETENASE®	0 gg	0 ore	●●
DODICILE	0 gg	0 ore	SP
DOLOVET® vet 2,4 g	1 gg	0 gg	●●●
DOMIDINE®	2 gg cavalli, bovini (carni e visceri)	12 ore	●●●
ELMIPUR®	28 gg	9 gg	●●●
ENDOFER®	0 gg	-	●●
ENDOFER® 20	0 gg	-	●●
FATROCICLINA®	2 gg suini - 6 gg vitelli	-	●●●
FATROCORTIN (2)	16 gg bovini - 3 gg suini - 24 gg cavalli	72 ore (6 mungiture - 3 giorni)	●●●
FATROMECTIN® Pour-on (5)	31 gg	-	●●●
FATROMICINA 6.000.000 U.I. + 5 g	74 gg	168 ore	●●●
FATROXIMIN® ENDOMAMMARIO ASCIUTTA	0 gg	0 ore	●●●
FATROXIMIN® ENDOUTERINO SCHIUMA (1)	0 gg	0 ore	●●●
FATROXIMIN® PESSARI EFFERVESCENTI (1)	0 gg	0 ore bovini - 72 ore bufalini	●●●
FATROXIMIN® SPRAY TOPICO	0 gg	0 ore	●●
FLUMEXIL® pasta orale 1,5 %	8 gg suinetti, agnelli, capretti - 6 gg conigli	-	●●●
FLUMEXIL® sospensione iniettabile 5% (2-3-4)	8 gg bovini, bufalini, equini, ovi-caprini, suini 6 gg polli, conigli	48 ore bovini, bufalini 144 ore caprini	●●●
GANABEN® SP	12 gg	-	●●●
GANADOL	0 gg	-	●●
HEPAGEN®	0 gg	0 ore	●●
IDRADE	0 gg	0 ore	●●
METABOLASE®	0 gg	0 ore	SP
METABOLASE® FORTE	0 gg	0 ore	●●
MIGOSPECTONE® soluzione iniettabile	20 gg bovini, 18 gg suini	72 ore (6 mungiture)	●●●
MIGOSPECTONE® polvere solubile (4)	14 gg vitelli, suinetti - 7 gg polli	-	●●●
NEATOX	0 gg	0 ore	●●
NEODIARISTIN (1)	44 gg	-	●●●
NEOPRIDIMET	5 gg	-	●●●
NEUROFISIN	0 gg	0 ore	●●
OXTRA® LONG ACTING (4)	42 gg bovini, bufalini, suini, caprini, ovini 35 gg polli da carne, tacchini	15 gg	●●●
OXTRA® MV 10 (2)	15 gg bovini, 8 gg suini - 23 gg equini - 20 gg ovini	144 ore bovini - 216 ore ovini	●●●
PREQUILLAN® per equidi (1)	non pertinente	-	●●●
PRIDIMET soluzione iniettabile	20 gg	84 ore (7 mungiture)	●●●
PRIDIMET soluzione orale	10 gg suinetti, polli 15 gg tacchini - 20 gg vitelli	-	●●●
REPEN® (1)	74 gg	90 ore bovini - 162 ore ovi-caprini	●●●
REUFLOGIN® per equidi (1)	non pertinente	-	●●●
REUFLOGIN® per bovini e suini (5)	15 gg bovini - 12 gg suini	-	●●●
SADIMET (2)	Bovini: 6 gg e.v., 14 gg i.m./s.c., 35 gg os. - Equini 9 gg e.v., 14 gg i.m./s.c., 35 gg os. Ovini-Suini 10 gg e.v., 14 gg i.m./s.c., 35 gg os	Bovini: 60 ore e.v., 264 ore i.m./s.c., 672 ore os. Ovini: 192 ore e.v., 264 ore i.m./s.c., 672 ore os.	●●●
SELEVIT®	0 gg	-	●●
SIMPANORM®	1 gg	12 ore	●●●
SUPRAMOX® S.P. (4)	20 gg vitelli - 2 gg suini - 1 gg polli, tacchini	-	●●●
SUPRATIL	28 gg bovini - 8 gg suini	72 ore (6 mungiture)	●●●
SVERMINATOR	21 gg	72 ore (6 mungiture - 3 giorni)	●●●
TIRSAN® o.s. (4)	35 gg vitelli da latte - 5 gg suini - 6 gg broiler	-	●●●
TOLOXAN	28 gg bovini - 42 gg ovi-caprini	-	●●●
URFAMYCIN® VET	8 gg bovini - 13 gg suini - 16 gg caprini	48 ore bovini - 120 ore caprini	●●●
VETAMPLIUS® (2)	3 gg bovini - 9 gg ovini, equini, suini	5 giorni bovini, ovini (10 mungiture)	●●●
VETAMPLIUS® MUCOSOL (1-4-5)	3 gg bovini - 14 gg suini - 11 gg polli	-	●●●
VETAMPLIUS® SUINI	3 gg	-	●●●
VETAMPLIUS® 750 mg/g (per broiler e tacchini) (4)	1 gg polli da carne - 2 gg tacchini	-	●●●
WONDERCEP®	1 gg bovini - 2 gg suini	0 ore	●●●
ZOOCOLAGOGO CM	0 gg	0 ore	SP

PREMISCELE PER ALIMENTI MEDICAMENTOSI

PRODOTTO	TEMPI DI SOSPENSIONE CARNI	TEMPI DI SOSPENSIONE LATTE	RICETTA
COMBOMIX® (4)	3 gg suini - 2 gg polli	-	●●●
GANABEN® PREMIX	12 gg suini	-	●●●
GANADOL PREMIX	0 gg suini	-	●●
NEOPRIDIMET ORALE	3 gg suini - 250 gradi/giorno salmonidi	-	●●●
PRACETAM® 10%	1 gg suini	-	●●
TIRSAN® POLVERE (4)	5 gg suini - 8 gg broiler	-	●●●

VACCINI FATRO - BOVINI / SUINI / OVINI / CONIGLI / PESCI / AVIARI: tempi di sospensione: 0 giorni - 0 ore

- (1) Il prodotto non deve essere somministrato ad equidi allevati a scopo alimentare. Per equidi non destinati alla macellazione per il consumo umano.
 (2) Uso non consentito in equidi che producono latte per il consumo umano.
 (3) Non somministrare ad ovini il cui latte sia destinato al consumo umano.
 (4) Non somministrare ad animali in ovodeposizione le cui uova siano destinate al consumo umano.
 (5) Non somministrare ad animali in lattazione, il cui latte sia destinato al consumo umano.

- Ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile
- Ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile
- Ricetta medico-veterinaria ripetibile
- SP Senza prescrizione